

# Endoproteesimise raviteekond - haiglast välja kirjutamine operatsiooni järel

Sisse logimisel kasutatud kasutajanimi.

---

Patsiendi isikukood

---

Operatsiooni kuupäev

---

Kontrollimiseks, kas käesolev ankeet on selle patsiendi kohta juba täidetud.

---

Ühe patsiendi konkreetsel päeval tehtud operatsiooni kohta saab käesoleva ankeedi täita ainult ühe korra. Kui keegi on selles haiglas selle patsiendi näidatud kuupäeval toimunud operatsiooni kohta käesoleva ankeedi juba täitnud, näidatakse veateadet. Sel juhul palun kontrollige isikukood üle, või pange käesolev aken lihtsalt kinni.

Patsiendi e-posti aadress, kuhu saata patsiendiküsimustike kutsed.

(Kirjuta siia üks e-posti aadress)

Mis keeles patsient eelistab küsimustikke täita?

- eesti  
 vene

Mis liigese kohta tuleks need küsimustikud täita?

- parem põlv  
 vasak põlv  
 parem puus  
 vasak puus

Kirurgiline juurdepääs

- Posterolateraalne  
 Anterolateraalne  
 Tagumine  
 Eesmine  
 Muu  
 Ei ole teada

Täpsustage muu juurdepääs

---

Profülaktiline antibiootikum

- ainult tsefasoliin  
 muu antibiootikum või mitte ainult tsefasoliin  
 haiglas ei kasutatud profülaktilist antibiootikumi

Kirjutage siia haiglas kasutatud antibiootikumid (ja haiglast koju kaasa antud antibiootikumid). Pärast haiglast välja kirjutamist kasutatavaid antibiootikume pole siia vaja (kui nende kohta on patsiendile kirjutatud retsept).

Tsefasoliini doos

- 1 g  
 2 g  
 muu

---

Tsefasoliini muu doos (g)

---

Antibiootikum

Kirjutage toimeaine(d) või "muu", kui loetelust ei leia, ja täpsustage avanevasse lahtrisse.

Doos Doosi ühik

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

---

Miks kasutati muud antibiootikumi tsefasoliini asemel / peale tsefasoliini?

- Allergia tsefasoliini vastu  
 Muu põhjus

---

Tromboosi ennetus

- Jah  
 Ei

---

Proteesi kood

---

---

Patsiendi kogemusküsimustiku link (täitmiseks 3 kuud pärast põlve endoproteesimist või 6 kuud pärast puusa endoproteesimist)

---

---

Üldandmete küsimustiku, Oxfordi põlve/puusa küsimustiku ja elukvaliteedi küsimustiku link (täitmiseks üks aasta pärast endoproteesimist)

---