


Juhend on koostatud: aprill 2021

**Juhendi koostajad:** Anneli Vaalma, Eda Tamm, Gleb Denissov, Irina Dontšenko, Jevgenia Epštein, Kai Zilmer, Kaily Susi, Kalev Karu, Kelli Podošvilev, Krista Kärt, Kristiina Kahur, Mait Altmets, Malle Avarsoo, Marina Kaarna, Merje Tikk, Piret Viiklepp, Sirje Kaarna, Teele Orgse, Triin Perkson, Ulla Raid

## COVID-19 täiendavate koodide kasutamise juhised RHK-10 alusel



## U07.1 COVID-19, laboratoorselt kinnitatud

## U07.2 COVID-19, laboratoorselt kinnitamata

Kirjeldus:

- ✓ Märkige ainult kaasuva diagnoosina.
- ✓ Kasutage **U07.1** koodi ainult siis, kui COVID-19 haigus on laboratoorselt kinnitatud. Sümptomite olemasolul kasutage U07.1 kaasuva diagnoosina, põhidiagnoos märkige vastavalt sümptomitele, nt J06.9; J12.8 vm. Kui haigus on laboratoorselt kinnitatud ja sümptomid puuduvad, märkige põhidiagnoosiks Z22.8.
- ✓ Kasutage **U07.2** koodi, kui COVID-19 viirusele pole laboratoorset kinnitust või kui laboratoorset testi pole võimalik teha, aga on selge kliiniline pilt ja/või epidemioloogiline kahtlus, sh võimalik kokkupuude. Kasutage U07.2 kaasuva diagnoosina, märkides põhidiagnoosi vastavalt sümptomitele, nt J06.9; J12.8 vm. COVID-19 kahtlusel võimaliku lähikontakti tõttu, kuid sümptomite puudumisel lisage põhidiagnoosiks sobiv jälgimise või profülaktikameetme diagnoos ning kaasuvaks diagnoosiks märkige U07.2.

## U08 COVID-19 anamneesis Personal history of COVID-19

## U08.9 COVID-19 anamneesis, täpsustamata Personal history of COVID-19, unspecified

Kirjeldus:

- ✓ Märkige ainult kaasuva diagnoosina.
- ✓ Kasutage koodi inimese terviseseisundi kirjeldamiseks kinnitatud või tõenäoliselt läbipõetud COVID-19 dokumenteerimisel, kui puuduvad sümptomid, aga juhtum on seotud läbipõetud COVID-19ga;
- ✓ Koodi võib kasutada ka patsiendi ühest raviasutusest teise üleviimisel peale nakkusohtliku perioodi möödumist. Aitab eristada patsiente, kes ei vaja täiendavat testimist vastavalt Terviseameti COVID-19 isolatsiooninõuete kriteeriumite juhendile ([https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/covid-19\\_isolatsiooninouete\\_kriteeriumid\\_02.02.2021.pdf](https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/covid-19_isolatsiooninouete_kriteeriumid_02.02.2021.pdf)).
- ✓ Seda koodi ei kasutata surma algpõhjuse kodeerimiseks.

## U09 COVID-19 järgne seisund Post COVID-19 condition

## U09.9 COVID-19 järgne seisund, täpsustamata Post COVID-19 condition, unspecified

Kirjeldus:

- ✓ Märkige ainult kaasuva diagnoosina.
- ✓ Kasutage koodi COVID-19 põdemise järgselt inimese terviseprobleemi kirjeldamisel. Koodi ei kasutata juhtudel, kui inimene on praegusel hetkel COVID-19 haige.
- ✓ Kasutage põhidiagnoosina COVID-19 põdemise järgselt terviseseisundi kirjeldamiseks koode: nt R06.0 hingeldus, R43.0 anosmia ehk haistmisvõimetus jne.

## U10 COVID-19 tekkeline süsteemne põletikuline sündroom Multisystem inflammatory syndrome associated with COVID-19

## U10.9 COVID-19 tekkeline süsteemne põletikuline sündroom, täpsustamata Multisystem inflammatory syndrome associated with COVID-19, unspecified

Hüpertõkineemia (tsütokiinorm)  
Kawasaki-tüüpi sündroom  
Lapseea süsteemne põletikuline sündroom (PIMS MIS-C)  
Täiskasvanute süsteemne põletikuline sündroom (MIS-A)

COVID-19 tekkeline

Kirjeldus:

- ✓ Märkige täiskasvanul vastavalt seisundile kas põhidiagnoosina või kaasuva diagnoosina ning lastel märkige põhidiagnoosina.
- ✓ Kasutage koodi eriarstiabis. Kood sisaldab COVID-19 tekkelist hüpertõkineemiat (tsütokiinormi), Kawasaki-tüüpi sündroomi, lapseea süsteemset põletikulist sündroomi (PIMS, MIS-C), täiskasvanute süsteemset põletikulist sündroomi (MIS-A).
- ✓ Kui ei ole selget seost COVID-19ga, kasutage M30.3 limaskesta-naha-lümfisõlme sündroomi (Kawasaki).

**U11 Immuniseerimise vajadus COVID-19 vastu** Need for immunization against COVID-19

**U11.9 Immuniseerimise vajadus COVID-19 vastu, täpsustamata** Need for immunization against COVID-19, unspecified

Kirjeldus:

- ✓ Märkige põhidiagnoosina.
- ✓ Kaasuva diagnoosina märkige juhul, kui vastuvõtul tegeleti peamiselt muu tervise seisundiga.
- ✓ Kasutage koodi, kui inimene kohtub tervishoiuteenuse osutajaga profülaktiliseks immuniseerimiseks COVID-19 vastu.
- ✓ Juhul kui inimene tuli küll vastuvõtule, aga COVID-19 vastu immuniseerimine jäi teostamata, kasutage teostamata immuniseerimise koodi, nt Z28.
- ✓ Ärge kasutage koodi surma algpõhjuse kodeerimiseks ega rahvusvaheliseks võrdluseks.

**U12 COVID-19 vaktsiini põhjustatud soovimatu mõju** COVID-19 vaccines causing adverse effects in therapeutic use

**U12.9 COVID-19 vaktsiini põhjustatud soovimatu mõju, täpsustamata** COVID-19 vaccines causing adverse effects in therapeutic use, unspecified

Kirjeldus:

- ✓ Märkige kaasuva diagnoosina.
- ✓ Seda koodi kasutage juhul, kui COVID-19 vaktsiini korrektne profülaktiline manustamine põhjustas soovimatu mõju, kaasuva diagnoosina. Põhidiagnoosina kasutage mõne teise peatüki koodi, mis kirjeldab soovimatu mõju olemust (näiteks palavik, nõrkus, valu jm).
- ✓ Kasutage välispõhjuse kodeerimiseks analoogselt Y59.0 Muud ja täpsustamata vaktsiinid ja bioloogilised ained: viirusvaktsiinid.