

Indikaatori nimetus	Erakorralise meditsiini osakonna indikaator 6: Septilises seisundis patsientide osakaal, kelle antibakteriaalne ravi oli alustatud hiljemalt 1 tunni jooksul alates arstliku läbivaatuse algusest erakorralise meditsiini osakonnas.
Indikaatori kirjeldus/ Vajaduse põhjendus	„Sepsise ja septilise šoki ravijuhendi“ (2018) kohaselt peab sepsise, sh septilise šoki äratundmisel alustada empiirilist antimikroobset ravi ühe tunni jooksul. Antud kvaliteediindikaatori analüüs näitab EMOs toimuva diagnostilise ja ravi protsessi efektiivsust.
Definitsioon	Septilises seisundis patsientide osakaal, kelle antibakteriaalne ravi oli alustatud hiljemalt 1 tunni jooksul alates arstliku läbivaatuse algusest erakorralise meditsiini osakonnas.
Indikaatori tüüp	Protsessi indikaator
Lugeja	Y - Sepsise juhtumite arv, mille antibakteriaalne ravi oli alustatud hiljemalt 1 tunni jooksul alates arstliku läbivaatuse algusest EMOs.
Nimetaja	N - Sepsise juhtumite üldarv EMOs.
Valem	X (%) = Y/N*100
Sihtgrupp	Septilises seisundis patsiendid
Eeldused indikaatori arvutamiseks	<ul style="list-style-type: none"> • Sepsise diagnoos on haiglast väljakirjutamisel • Diagnoosid A40.0-A41.9; • Statsionaarse ravi tunnus • EMO visiidi tunnus • Haiglasse saabumise aeg • Arstliku läbivaatuse alustamise aeg • Antibakteriaalse ravimi esimese manustamise aeg
Sisse arvatud	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnoosid A40.0-A41.9; • EMOst statsionaarsele ravile suunatud patsiendid
Välja arvatud	<ul style="list-style-type: none"> • Teistest raviasutustest suunatud patsiendid
Tõlgendus	Vähemalt 70%
Andmeallikad	Haigla infosüsteem
Jälgimisperiood	Jälgimisperiood 01. jaanuar – 31. detsember. Andmeid analüüsitakse 1 kord aastas.
Edasine informatsioon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepsise ja septilise šoki ravijuhend - esmane diagnostika ja ravivõtted (RJ-A/25.1-2018) (RJ-A/25.1-2018) 2. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), 2016