

<b>Indikaatori nimetus</b>	<b>Neuroloogia indikaator 8: Esimese kuu jooksul pärast insulti haigestumist statsioonarset taastusravi saanud patsientide osakaal.</b>
<b>Indikaatori kirjeldus/ vajaduse põhjendus</b>	Taastusravi on näidustatud insuldiga patsientidele võimalikult varakult pärast insulti. Kõikidele patsientidele ei ole taastusravi näidustatud (neuroloogiline leid taandunud, ei ole võimeline aktiivseks taastusraviks), kuid riiklikul tasemel ja maakondade kaupa on võimalik monitoorida trende.
<b>Definitsioon</b>	Osakaal insuldiga patsientidest, kes on saanud statsioonarset taastusravi esimese kuu jooksul alates hospitaliseerimise kuupäevast.
<b>Indikaatori tüüp</b>	Protsessi indikaator
<b>Lugeja</b>	<b>M</b> – Erakorraliselt hospitaliseeritud insulti haigestunud patsiendid, kes on olnud statsioonarset taastusravi esimese kuu jooksul alates hospitaliseerimise kuupäevast.
<b>Nimetaja</b>	<b>N</b> - Erakorraliselt hospitaliseeritud insulti haigestunud patsiendid.
<b>Valem:</b>	<b><math>X(\%) = (M/N) * 100</math></b>
<b>Sihtgrupp:</b>	Ajuinfarktiga (RHK I63.0-I63.9) või intratserebraalse hemorraagiaga patsiendid (RHK I61.0-I61.9) alates 19.ndast eluaastast
<b>Eeldused indikaatori arvutamiseks:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insulti haigestunud (RHK I63.0-I63.9 või RHK I61.0-I61.9) patsiendid</li> <li>• Hospitaliseerimise kuupäev</li> <li>• Stationaarse taastusravi märke haigusloos Taastusravi alustamise kuupäev</li> <li>• Erakorralise abi tunnus</li> <li>• Stationaarse ravi tunnus</li> </ul>
<b>Sisse arvatud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuinfarktiga (RHK I63.0- I63.9) või intratserebraalse hemorraagiaga patsiendid (RHK I61.0-I61.9) patsiendid</li> <li>• Patsiendid alates 19.ndast eluaastast</li> <li>• Stationaarse taastusravi saanud patsiendid (TTL 8028; 8029)</li> <li>•</li> </ul>
<b>Välja arvatud</b>	-
<b>Tõlgendus</b>	Eesmärk: 50%
<b>Andmeallikad</b>	EHK raviarved
<b>Jälgimisperiod</b>	Jälgimisperiod 01. jaanuar- 31. detsember

<b>Edasine informatsioon</b>	<p>1. European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee; ESO Writing Committee. Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischaemic Attack 2008. Cerebrovasc Dis. 2008;25:457-507.</p> <p>2. Jauch EC, Saver JL, Adams HP Jr, et al; .Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2013;44:870-947.</p> <p>3. <a href="http://www.kcks-vest.dk/forside">http://www.kcks-vest.dk/forside</a></p> <p>4. Quality and Efficiency in Swedish Health Care. Regional Comparisons 2012. Swedish Association of Local Authorities and Regions. Swedish National Board of Health and Welfare 2013.</p> <p>5. Stroke Unit Trialists' Collaboration: Organised inpatient (stroke unit) care for stroke; in: Cochrane Library, Issue 2, 2013;9:CD000197. doi: 10.1002/14651858.CD000197.</p>
------------------------------	---

<b>Indikaator 8 rakendusjuhend:</b>	<b>Esimese kuu jooksul pärast insulti haigestumist statsionaarset taastusravi saanud patsientide osakaal.</b>
<b>Võrreldav rahvusvaheline dimensioon</b>	Ühtne rahvusvaheline võrdlus puudub. Indikaator on välja töötatud ja kokku lepitud eriala ekspertide poolt vastavalt kohalike olude vajaduste hindamisele.
<b>Eesmärk</b>	<p>Mõõta patsientide osakaalu, kes on saanud statsionaarset taastusravi esimese kuu jooksul peale hospitaliseerimist kogu haigestunud patsientide hulgast.</p> <p>Indikaator on defineeritud mõõtmaks trende.</p> <p>Ravistandarditele tuginev taastusravi saanute osakaalu eesmärk on 50% kogu haigestunud patsientidest. 50% sisse on arvestatud esimese kuu jooksul surnud patsiendid ja patsiendid, kellele on taastusravi vastunäidustatud.</p>
<b>Arvestus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arvestusse kuuluvad patsiendid, kellel on põhidiagnoosina RHK I61 või I63. Arvestuse alguseks on hospitaliseerimise kuupäev.</li> <li>• Arvestus on haigusjuhu põhine. Tingituna patsiendi suunamisest teise raviasutusse, loetakse üheks haigusjuhuks, kui diagnoosipõhise ravi alguse kuupäev erinevates raviasutustes mahub 30 päeva sisse (hospitaliseerimise kuupäev + 30 päeva). Patsiendi korduval insulti haigestumisel loetakse iga akuutravi eraldi juhtumiks.</li> </ul>
<b>Andmete edastamiseks vajalikud lahendused</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuutravi lõppu tähistab taastusravi koodidega statsionaarse ravi arve, kus on kas füsioteraapia, tegevusteraapia või logopeedilise hindamise või tegevuse koodid.</li> <li>• Elektroonne märgede piiritlemiseks haigusloos akuutjuhu lõppu vastavalt vajadusele.</li> </ul>