

Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmade vaksineerimisskeemid

1. Pneumokokkvaktsiinide kasutamine riskirühmadel

Vanus vaksineerimise alustamisel	Soovitav vaksineerimisskeem
6 nädala – 6 kuu vanused riskirühma lapsed	3 doosi konjugeeritud vaktsiini (kas PCV20, PCV15, PCV13 või PVC10) vähemalt 4-nädalaste intervallidega, 4. doos sama vaktsiini 11-15 kuu vanuses
7 – 11 kuu vanused riskirühma lapsed	2 doosi konjugeeritud vaktsiini (kas PCV20, PCV15, PCV13 või PVC10) vähemalt 4-nädalaste intervallidega, 3. doos sama vaktsiini 12-15 kuu vanuses (vähemalt 8 nädalat pärast 3. doosi)
12 – 23 kuu vanused riskirühma lapsed	2 doosi konjugeeritud vaktsiini (kas PCV20, PCV15, PCV13 või PVC10) vähemalt 8-nädalase intervalliga
24 kuu kuni 5 aasta vanused riskirühma lapsed	<ul style="list-style-type: none"> • 1 doos PVC 20 või 1 doos PCV15, PCV13 või PCV10 ja minimaalselt 8-nädalase intervalliga 1 doos PPSV23
6 aasta kuni 64-aasta vanused riskirühma isikud	<ul style="list-style-type: none"> • 1 doos PCV20 või 1 doos PCV15 või PCV13 ja minimaalselt 8-nädalase intervalliga PPSV23
65+ täiskasvanud	<ul style="list-style-type: none"> • 1 doos PCV20 või <ul style="list-style-type: none"> • 1 doos PCV15 või PCV13 ja minimaalselt 1-aastase intervalliga PPSV23
65+ riskirühma täiskasvanud	<ul style="list-style-type: none"> • PCV20 1 doos või PCV15 või PCV13 ja minimaalselt 8-nädalase intervalliga PPSV23 ning 5-aastase intervalliga PPSV23

2. Meningokokkvaktsiinide MenACWY-TT (Nimenrix) ja MenACWY-CRM₁₉₇ (Menveo - Ei turustata Eestis) kasutamine riskirühmadel

Vanus vaksineerimise alustamisel	Vaktsiin	Soovitav vaksineerimisskeem
< 12 kuud (lubatud alates 6 nädala vanusest)	Nimenrix	2 doosi (8 nädalase intervalliga). Revaksineerimine: 12 kuu vanuses või hiljem.

>12 kuud lapsed ja noorukid	Nimenrix	1 doos
>24 kuud lapsed ja noorukid	Nimenrix; Menveo	1 doos
Täiskasvanud <55	Nimenrix; Menveo	1 doos
>56	Nimenrix; Menveo	Andmed puudulikud
Revaktsineerimine	Nimenrix; Menveo	Ametlik soovitus puudub. Vajadusel võib revaktsineerida.

3. Meningokokkvaktsiinide MenB (Bexsero/Trumenba) kasutamine riskirühmadel

MenB (Bexsero)

Vanus vaktsineerimise alustamisel	Soovitav vaktsineerimisskeem
8 nädalat – 5 kuud	2 doosi vähemalt 8-nädalase intervalliga Revaktsineerimine 12-15 kuu vanuses või vähemalt 6 kuud peale esmasvaktsineerimist
6 –11 kuud	2 doosi vähemalt 8-nädalase intervalliga Revaktsineerimine teisel eluaastal vähemalt 2 kuud peale esmasvaktsineerimist
12 – 23 kuud	2 doosi vähemalt 8-nädalase intervalliga Revaktsineerimine 1 doosiga vähemalt 12-23 kuulise intervalliga peale esmasvaktsineerimist
2 aastat – 50 aastat	2 doosi vähemalt 4-nädalase intervalliga Revaktsineerimist tuleks kaaluda. Ametlikud soovitused puuduvad
>50 aasta vanused	Andmed kasutamise kohta puuduvad

Võimalik osaline alternatiiv:

MenB (Trumenba)

NB! Seni Eestisse toodud ei ole

Vanus vaktsineerimise alustamisel	Soovitav vaktsineerimiskeem
10 – 25 aastat	2 doosi (vaktsineeritakse vähemalt 1-kuulise intervalliga). 3. doos 4 kuud pärast 2. doosi.
40 – 65 aastat	Andmed piiratud
65 ja vanemad	Andmed puuduvad
Revaktsineerimine	Suurema invasiivse meningokokilise haiguse riskiga patsientidel võib kaaluda.

NB! Bexsero ja Trumenba korral kasutada ainult ühte vaktsiini.