

Indikaatori nimetus	Emakakaelavähi indikaator: Diagnostilise konisatsiooni olemasolu enne radikaalset kirurgilist ravi varase emakakaelavähi (Tis, T1a1,T1a2) korral.
Indikaatori kirjeldus/ Vajaduse põhjendus	<p>Diagnostiline konisatsioon on oluline protseduur varase emakakaelavähi ravitaktika, operatsioonimahu ulatuse hindamiseks. Konisaadi patohistoloogilisest leiust sõltub järgnev kirurgilise ravi maht, kas on võimalik vajadusel fertiilsust säilitada ja kas on vajalik tingimata eemaldada vaagna lümfisõlmi. Kohene radikaalne hüsterektoomia koos vaagna l/s eemaldamisega võib kaasa tuua põhjendamatuid hilisemaid probleeme patsiendi elukvaliteedis ja mittevajalikke ravi kõrvaltoimeid (1-2).</p> <p>Rahvusvaheline mõõde hetkel ei tea, aga on oluline näitaja varase emakakaelavähi ravitaktikas, üleravi, tüsistuste vältimisel. Haigekassa auditis jäänud ekspertidele silma kui probleem Eestis patsientide käsitlusel.</p>
Definitsioon	Patsientide osakaal, kellel oli tehtud enne radikaalset kirurgilist ravi diagnostiline konisatsioon.
Indikaatori tüüp	Protsessi indikaator
Lugeja	Y - Koniseeritud patsiendid
Nimetaja	N - Kõik pTis, pT1a1, pT1a2 (staadium 0, IA1, 1A2) patsiendid
Valem	$X (%) = (Y/N) * 100$
Sihtgrupp	Kõik pTis, pT1a1, pT1a2 levikuga esmased emakakaelavähi diagnoosiga patsiendid.
Eeldused indikaatori arvutamiseks	<ul style="list-style-type: none"> • Põhidiagnoos RHK C53-C53.9 • Konisatsiooni teostamise kuupäev (NOMESCO koodid LDC00 või LDC03 või LDC10) • Radikaalse kirurgilise operatsiooni kuupäev NOMESCO koodide kombinatsioonidega: <ol style="list-style-type: none"> 1) laparoskoopia: LCD31+PJD64 2) või laparoskopiline trahhelektoomia LDC96+LEW97+PJD64 3) või LCD04 (in situ puhul) 4) või laparotoomia LCD30+PJD54 5) või lahtine trahhelektoomia LDC96+LEC00+ PJD54 6) või LCD00 7) haiguse staadium 0, IA1, 1A2 • Patsiendi vanus alates 18. eluaastast Statsionaarse või päevaravi tunnus
Sisse arvatud	Kõik staadiumid 0, IA1, 1A2
Välja arvatud	-
Tõlgendus	Eesmärk: 95%
Andmeallikad	<ul style="list-style-type: none"> • Haigla infosüsteem • Epikriisid

	<ul style="list-style-type: none">• Raviarved
Jälgimisperiood	Aluseks radikaalse operatsiooni kuupäev. Jälgimisperiood 01. jaanuar – 31. detsember, konisatsiooni kuupäev eelmise aasta 01. november.
Edasine informatsioon	1. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/cervical.pdf (vaadatud mai 2016) 2. ESGO kliinilised ravijuhendid www.esgo.org