




## Laste vaksineerimissoovitused immuniseerimiskava väliste vaktsiinidega ja gripi vaktsiiniga vastavalt immuniseerimiskavale

-  Tasuta kõigile lastele vanuses 6 kuud kuni 7 aastat ja krooniliste haigustega lastele vanuses 8-18 aastat (riikliku immuniseerimiskava raames)
-  Tasuta riskirühma lastele (Tervisekassa raviteenusena)
-  Kõigile tasuline vaktsiin

VAKTSIIN	Sihtrühm	Vaktsiiniannuste arv ja intervallid	Märkused
<b>Gripp, süstitav vaktsiin</b>	6 kuu kuni 7 aasta vanused lapsed ning 8-17 aasta vanused raskete krooniliste haigustega lapsed	Igal aastal gripihooaja eel või ajal 1 annus, v.a. lapsed vanuses 6 kuud kuni 8 aastat (kaasa arvatud), keda ei ole varem gripi vastu vaksineeritud: esmakordsel gripi vastu vaksineerimisel 2 annust $\geq 4$ -nädalase intervalliga	Riikliku immuniseerimiskava raames on süstitavad gripivaktsiinid <b>tasuta</b> kõigile 6 kuu kuni 7 aasta vanustele lastele ning neile 8-17 aasta vanustele lastele, kellel terviseseisundi tõttu on suurenenud risk raskelt haigestuda (südame- ja veresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused, immuunpuudulikkus, diabeet ja obstruktiivne kopsuhaigus).
Gripp, ninasiseselt manustatav vaktsiin	2 – 17 aasta vanused lapsed	1 annus igal aastal gripihooaja eel või ajal. Lastele vanuses 2 kuni 8 aastat, keda ei ole varem gripi vastu vaksineeritud: esmakordsel gripi vastu vaksineerimisel 2 annust $\geq 4$ -nädalase intervalliga.	Vaktsiin manustatakse jagatud annusena mõlemasse ninasõõrmesse. Nõrgestatud elusvaktsiin, vastunäidustatud immuunpuudulikkuse korral, täpsemalt vt vastunäidustusi vaktsiini ravimiomaduste kokkuvõttest.
<b>Meningokokknakkus</b>	Riskirühma lapsed	Terviseseisundite tõttu <a href="#">riskirühma kuuluvatele lastele</a> on näidustatud vaktsiinid ning nende	Terviseseisundite tõttu <a href="#">riskirühma kuuluvatele lastele</a> on vaktsiin Tervisekassa tervishoiuteenusena haiglate

		vaktsiinide annustamise skeemid (sõltuvalt vaktsineerimisega alustamise vanusest) leiate <a href="https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/documents/2024-11/pneumo-ja_meningokokkvaktsiinide_vaktsineerimisskeemid_2024_.pdf">https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/documents/2024-11/pneumo-ja_meningokokkvaktsiinide_vaktsineerimisskeemid_2024_.pdf</a>		juures asuvates vaktsineerimiskeskustes <b>tasuta</b> . Perearstikeskustes tasuta vaktsiinid saadaval ei ole. Selle osas, kas ja milline meningokokkvaktsiin on reisimise eel näidustatud, on soovitatav pidada nõu infektsionistiga.	
<b>Puukentsefaliit</b>	Lapsed alates 1 aasta vanusest		<i>Encepur</i> (tabelis toodud tava skeem, ülikiiret skeemi palun vt ravimiomaduste kokkuvõttest)	<i>Ticovac</i> (tabelis toodud tava skeem, kiirskeemi korral 2. annus 14 päeva pärast 1. annust)	<b>Vanuselised näidustused</b> <i>Encepur</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>vanus 1-11 a: <i>Encepur Children</i></li> <li>vanus 12+ a: <i>Encepur Adult</i></li> </ul> <i>Ticovac:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>vanus 1-15 a: <i>Ticovac 0,25</i></li> <li>vanus 16+: <i>Ticovac 0,5</i></li> </ul>
		1. annus	Valitud kuupäeval		
		2. annus	1 kuu kuni 3 kuud pärast 1. annust		
		3. annus	9-12 kuud pärast 2. annust	5-12 kuud pärast 2. annust	
		Esimene revaktsineerimine	3 aastat hiljem		
		Edasised revaktsineerimised	Lastel (ja täiskasvanutel kuni 50 a vanuseni) 10-aastase intervalliga		
<b>Pneumokokknakkus</b> Konjugeeritud vaktsiinid: PCV20 <i>Prevenar 20</i> ,	Lapsed alates 6 nädala vanusest	<a href="https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/documents/2024-11/pneumo-">Riskirühma kuuluvatel lastel</a> kasutatakse tõhustatud vaktsineerimisskeeme: <a href="https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/documents/2024-11/pneumo-">https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/documents/2024-11/pneumo-</a>		<a href="#">Riskirühma kuuluvatele lastele</a> on vaktsiin Tervisekassa raviteenusena <b>tasuta</b> , vaktsineerimine on võimalik nii haiglate juures asuvates vaktsineerimiskeskustes kui ka perearstikeskustes.	

<p>PVC15 <i>Vaxneuvance</i>, PCV13 <i>Prevenar 13</i></p> <p>Polüsahhariidvaktsiin: PPSV23 <i>Pneumovax 23</i></p>		<p><a href="#">ja meningokokkvaktsiinide vaktsineerimisskeemid 2024 .pdf</a> )</p> <p>Riskirühma mittekuuluvatel lastel on vaktsineerimisskeemid sõltuvalt vanusest vaktsineerimise alustamisel järgmised:</p> <p><u>6 nädalat – 11 kuud:</u> 2 annust konjugeeritud vaktsiini (kas PCV20, PCV15 või PCV13) vähemalt 4-nädalaste intervallidega, 3. annus sama vaktsiini 11-15 kuu vanuses (vähemalt 8 nädalat pärast 2. annust)</p> <p><u>12 – 23 kuud:</u> 2 annust konjugeeritud vaktsiini (kas PCV20, PCV15 või PCV13) vähemalt 8-nädalase intervalliga</p> <p><u>24 kuu kuni 5 aastat 11 kuud:</u> 1 annus PCV20, PCV15 või PCV13</p>	<p>Kõrge riskiga riskirühma mittekuuluvatele lastele on vaktsineerimine <b>tasuline</b>.</p> <p>≥6 aasta vanustele riskirühma mittekuuluvatele lastele üldjuhul pneumokokkvaktsiin näidustatud ei ole.</p>
<p><b>Tuulerõuged*</b></p>	<p>Lapsed 9-11 kuu vanuses</p>	<p>2 annust vähemalt 3-kuulise intervalliga</p>	<p>Kokkupuutejärgseks ennetuseks tuleb 1. annus manustada soovitatavalt 72 tunni jooksul, hiljemalt 5 päeva jooksul kokkupuutest.</p> <p>Nõrgestatud elusvaktsiin, vastunäidustatud immuunpuudulikkuse korral, täpsemalt vt vastunäidustusi vaktsiinide ravimiomaduste kokkuvõtetest.</p>
	<p>Lapsed alates 1 aasta vanusest</p>	<p>2 annust 4-8-nädalase intervalliga</p>	

\*Nõrgestatud elusvaktsiin, vastunäidustatud immuunpuudulikkuse korral, täpsemalt vt vastunäidustusi vaktsiinide ravimiomaduste kokkuvõtetest

Märkus: kui vaktsiiniannuste manustamise intervallid on soovitatutest pikemad, võib nakkuskaitse vahepeal nõrgeneda. Juhul, kui immuniseerimine ei ole siiski toimunud vastavalt soovitatud skeemile ja vaktsiiniannust(de) manustamise intervall(id) on olnud soovitatust pikemad, ei ole vaja alustada immuniseerimisseeriat algusest peale, vaid see jätkub poolelijäänud kohast.