




Vaktsineerimise soovitused rasedatele, enne rasestumist ja imetamise ajal

	Soovitatud vaktsineerida
	Võib vaktsineerida näidustuse olemasolul
	Ei ole näidustust või on vastunäidustatud

Vaktsiinid	Enne rasedust	Raseduse ajal		Imetamine	Märkused
Gripp	Võib	Jah, soovitatud. Vaktsiini võib teha igal raseduse trimestril.	Raseduse ajal soovitatud	Võib	Vaktsiin on tugevalt soovitatud enne hooaja algust (oktoober-november) raseda kaitseks gripihooajal. Vaktsineerida võib kogu gripihooaja jooksul.
COVID-19	Võib	Jah, soovitatud. Vaktsiini võib teha igal raseduse trimestril.	vaktsiine võib teha samal visiidil või ükskõik millise ajalise intervalliga, v.a. dTap ja RSV-vaktsiinid, mille vahel on soovitatav intervall vähemalt kaks nädalat.	Võib	Vaktsiin on soovitatud raseda kaitseks, sest neil on suurem risk raskeks COVID-19 kuluks (sh risk lootele) võrreldes mitterasedate samaealiste naistega. Vaktsineerida võib tingimusel, kui viimasest vaktsineerimisest/läbipõdemisest on möödunud vähemalt 6 kuud või inimene ei ole siiani vaktsineeritud ja/või läbipõdenud.
Difteeria, teetanus, läkaköha (dTap vaktsiin)	Võib	Jah, soovitatud 28.-34. rasedusnädalal (võib manustada raseduse II ja III trimestril)		Võib	Vaktsiin on soovitatud eelkõige imiku kaitseks läkaköha vastu esimestel elukuudel. Vaktsiin on soovitatud iga raseduse ajal, sõltumata intervallist eelmise raseduse- ja eelmise dT vaktsineerimisega.
RSV, vaktsiin Abrysvo®	Võib	Jah, soovitatud 28.-34. rasedusnädalal (võib manustada 24.-36. rasedusnädala vahel)		Võib	Vaktsiin on soovitatud, kui raseduse kolmas trimester jääb vahemikku august-jaanuar, eelkõige imiku kaitseks RSV vastu esimestel elukuudel. Soovitatav intervall Abrysvo ja difteeria-teetanus-läkaköha (dTap) vaktsiinide manustamise vahel on vähemalt kaks nädalat.
Hepatiit A	Võib		Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Hepatiit B	Võib		Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Hib (<i>Haemophilus influenzae</i> tüüp b)	Võib		Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
HPV (<i>inimese papilloomiviirus</i>)	Võib		Ei	Võib	Teadmatusest raseduse ajal tehtud vaktsineerimine HPV vaktsiiniga ei ole näidustus raseduse katkestamiseks.
Leetrid, mumps, punetised (MMR vaktsiin)	Võib, rasedusest hoiduda vaktsineerimise järgselt 4 nädala jooksul		Ei	Võib, ettevaatusega*	Rasedust planeerival naisel on soovitatav teada oma MMR vaktsineerimise staatust ning vaktsineerimata naistele soovitate vaktsineerimist vähemalt 4 nädalat enne rasestumist. Teadmatusest raseduse ajal tehtud vaktsineerimine MMR vaktsiiniga ei ole näidustus raseduse katkestamiseks. *Kui lapsel on kinnitatud või kahtlustatav immuunpuudulikkus, tuleb imetamise ajal ema vaktsineerimisel hinnata riski-kasu suhet.
Pneumokokk	Võib		Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Puukentsefaliit	Võib		Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Poliomüeliit	Võib		Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.

Tuulerõuged	Võib, rasedusest hoiduda vaktsineerimise järgselt 4 nädala jooksul	Ei	Võib, ettevaatusega*	Rasedust planeerival naisel on soovitatav teada oma tuulerõugete läbipõdemise/vaktsineerimise staatust ning läbipõdemata/vaktsineerimata naistele soovitage vaktsineerimist vähemalt 4 nädalat enne rasestumist. Teadmatusel raseduse ajal tehtud vaktsineerimine tuulerõugete vaktsiiniga ei ole näidustus raseduse katkestamiseks. <i>*Kui lapsel on kinnitatud või kahtlustatav immuunpuudulikkus, tuleb imetamise ajal ema vaktsineerimisel hinnata riski-kasu suhet.</i>
Vöötohatid (vaktsiin Shingrix®)	Võib	Ei	Võib	Teadmatusel raseduse ajal tehtud vaktsineerimine vaktsiiniga Shingrix ei ole näidustus raseduse katkestamiseks.
Marutõbi	Võib	Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Meningokokk	Võib	Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Kollapalavik	Võib, rasedusest hoiduda vaktsineerimise järgselt 4 nädala jooksul	Ei*	Ei*	<i>*Raseduse ja imetamise ajal võib vaktsineerida suure nakatumise riski korral, kasu ja riskide hindamisel. Imetamise korral on soovitatav 2 nädala jooksul rinnapiim välja pumbata ja seejärel võib imetamist jätkata.</i>
Kõhutüüfus	Võib	Võib	Võib	Vaktsiini võib vajadusel teha igal raseduse trimestril.
Mpox (ahvirõuged)	Võib	Ei*	Ei*	<i>*Raseduse ja imetamise ajal võib vaktsineerida suure nakatumise riski korral, kasu ja riskide hindamisel.</i>
Difteeria-teetanus (dT)	Võib	Võib	Võib	

Märkus: ülaltoodud vaktsiinid on tasuta, välja arvatud:

- Gripi ja COVID-19 vaktsiinid on rasedatele tasuta
- Pneumokoki ja meningokoki vaktsiinid kõrge riskiga riskirühmade patsientidele (sh riskirühma rasedatele) tasuta, vt <https://terviseamet.ee/nakkushaigused/info-koostoopartneritele/vaktsineerimine>
- Difteeria-teetanuse (dT) vaktsiin on kõigile täiskasvanutele (sh rasedatele) tasuta.